


Faltenbehandlung mit Botulinumtoxin A

Für eine minimal-invasive Faltenbehandlung und die Behandlung medizinischer Erkrankungen wie Schielen, zervikale Dystonie, Blepharospasmus, erhöhte Steifigkeit der Muskulatur oder schwerer axillärer Hyperhidrose (übermäßiges Schwitzen der Achselhöhlen) wird Botulinumtoxin A verwendet

Wirkung von Botulinumtoxin A

Botulinumtoxin A blockiert überaktive Nervenimpulse und reduziert so Muskelkontraktionen. Nach 3 – 5 Tagen nach dem Einspritzen von Botulinumtoxin A entspannt sich die Muskulatur und nach 2 Wochen ist der Faltenrückgang festzustellen.

Die Wirkungsdauer beträgt in der Regel 4 – 6 Monate. Botulinumtoxin A kann horizontale Stirnfalten, Zornesfalten, Falten zwischen den Augenbrauen, Lachfalten, Nasenfältchen oder Lippenfältchen glätten.



Alle wichtigen Informationen auf einen Blick

Anwendungsgebiet

Faltenbehandlung, medizinische Erkrankungen (Schielen, zervikalen Dystonie, Blepharospasmus, erhöhte Steifigkeit der Muskulatur in Ellenbogen, Handgelenk und Fingermuskeln bei Erwachsenen mit Spastizität der oberen Extremitäten und Symptome schwerer primärer axillärer Hyperhidrose)

Im Vorfeld

Gesichts- und Mimikanalyse

Sichtbares Ergebnis

nach 3 - 5 Tagen, spätestens 2 Wochen

Wirkungszeit

In der Regel 4 - 6 Monate

Für weitere Fragen können Sie hier Kontakt aufnehmen